

Las razas cebuinas

Ganado Brahman: Orgullo Nacional en el siglo XXI

El árbol genealógico del actual ganado Brahman, se remonta al siglo XIX en los Estados Unidos, país en donde se suele usar este nombre genérico para referirse a los diversos tipos de ganado cebuino. Autores como Joe A. Akerman Jr. cuentan como se formó la raza en ese país a partir de 1860 y con múltiples cruces entre diversos ganados Bos Indicus, importados directamente de la India. Se dice que la mezcla efectuada durante décadas incluyó el aporte de las razas Guzerá, Nelore, Krishna Valley, además del Gyr. Posteriormente se añadió un componente Red Polled e Indubrasil, razas que fueron introducidas en diferentes épocas a Norteamérica.

Se sabe que inicialmente a este ganado se le designó como "Brama" y luego se le añadió a la palabra un sufijo latino, con lo cual se le llamó por un tiempo "Brahmin". Pero J. W. Sartwelle, quien fuera el primer directivo que tuvo la Organización de Criadores de Ganado Brahman de los Estados Unidos, fue quien adoptó oficialmente la palabra Brahman, hacia 1924, para designar esta nueva raza.

El Brahman en Colombia

En 1913 llegaron los primeros ejemplares Cebú a Colombia. Posteriormente, en el año 1927, procedentes del Brasil llegaron 4 vacas y el toro "Palomo", animales de la raza Nelore puro. Luego de varias importaciones efectuadas a partir de 1915 desde los Estados Unidos, de lotes de ejemplares puros Brahman, comenzó el trabajo de mestizaje con las razas existentes en el país. Una década después ya era posible adquirir animales 7/8 cebú, que transmitían a las vacadas criollas gran rusticidad, adaptación al medio y resistencia a enfermedades y plagas.

En 1946, se crea la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú -Asocebu, entidad que con un trabajo sistemático y con claros objetivos de mejoramiento y depuración de las diferentes razas cebuinas, ha logrado un evidente desarrollo de la ganadería de carne y leche en todo el territorio colombiano, en especial en las zonas de trópico bajo. Hacia 1956, el hato cebuino colombiano ya contaba con más de 15 mil animales, entre puros y de alto mestizaje.

El biotipo Brahman: en gris y rojo

Dentro de los patrones raciales propios de la raza Brahman, se destacan: su pelaje predominante blanco, especialmente en las hembras; aunque el color ceniza, sobre todo en la parte anterior del cuerpo, en el cuello y hasta en la giba, es muy frecuente. En Colombia hay excelentes hatos de pigmentación roja, en los que es evidente la influencia de las razas Red Sindhi y Gyr. Es poco frecuente la aparición de animales manchados, puesto que ese tipo de pelaje no es apreciado. Cabe destacar que algunos terneros nacen rojos, pero con los meses se vuelven ceniza o ceniza oscuro.

El Brahman en su gran mayoría, posee piel oscura y en cuanto a la conformación corporal se exige que debe estar libre de cualquier inclinación en la línea del dorso, a partir del anca hacia la giba. Su sacro nunca debe ser elevado, ni la grupa caída, así como el exceso de ombligo o de prepucio.

El animal típico Brahman es de buen tamaño, cabeza ancha, perfil recto, cuello corto y grueso, con barbilla desarrollada. Sus cuernos son cortos, medianamente gruesos y dirigidos hacia atrás y hacia afuera; las orejas son de tamaño mediano; las costillas deben ser bien arqueadas y separadas entre sí, pecho profundo y ancho; vientre, voluminoso, denotando gran capacidad. El tronco es cilíndrico, con caderas amplias y musculosas; el anca es inclinada y la cola de inserción suave.

Otras características de la raza son:

Precocidad: Su crecimiento y desarrollo muscular es muy rápido. Por su conformación tienen capacidad de producir más carne en menos tiempo, salen para sacrificio a más corta edad, con mayores pesos.

Habilidad materna: Levantan terneros en excelentes condiciones y con buenos pesos. Su instinto maternal es muy fuerte. Protege sus crías contra los enemigos naturales

Capacidad de producción: La vida productora del Brahman y sus cruces es más larga que la de las razas europeas. Sus toros sirven a un mayor número de hembras, son más fértiles

en condiciones tropicales y viven más años. Por su mayor longevidad, la vaca deja mayor descendencia y es más rentable. La ubre debe estar bien desarrollada, con pezones bien dispuestos, revelando capacidad lechera suficiente para la crianza de becerros precoces.

Características del BRAHMAN

La Federación Internacional de Criadores de Cebú (Ficebú) establece las siguientes características fenotípicas y de conformación general de estas razas cebuinas:

Características	Ideales	Permisibles
1 - APARIENCIA GENERAL		
1.1 – Estado General	Sano y Vigoroso	
1.2 - Desarrollo	Buena de acuerdo a la edad	Medio
1.3 - Constitución Esqueleto y Musculatura	Constitución robusta, esqueleto fuerte. Musculatura compacta y bien distribuida en todo el cuerpo.	
1.4 - Masculinidad o Femenidad	Caracteres bien definidos de acuerdo con el sexo y la edad.	
1.5 - Temperamento	Activo y dócil.	
2 – CABEZA		
2.1 - Apariencia General	Tamaño y longitud medias, armoniosa.	
2.2 - Perfil	Recto y subconvexo.	
2.3 – Frente	Ancha con ligera convexidad o plana.	Pequeña cresta ósea (nimhuri).
2.4 – Región Paranasal	De longitud mediana y recta; amplia y proporcional en el macho, más larga y delicada en la hembra.	
2.5 – Hocico	Negro con ollares bien separados y dilatados, en forma de coma.	Despigmentación parcial (lamida en la superficie de color negro).
2.6 – Ojos	Negros elípticos, vivos bien separados, orbitas levemente salientes.	Pestañas mezcladas con pelos blancos. Ojos gateados.
2.7 - Orejas	Tamaño medio, anchura moderada. Ligeramente inclinadas y pequeña curvatura en el tercio inferior, con terminación en punta redondeada.	Pendulosas y largas.
2.8 - Cuernos	Simétricos, de color oscuro.	Pequeñas manchas blancas en la punta o rayados. Descornado, ó mocho natural.
2.9 - Boca	Apertura mediana. Labios firmes.	
3 - PESCUEZO Y CUERPO:		
3.1 - Pescuezo	Proporcional al cuerpo, línea superior ligeramente oblicua. Bien musculado en los machos, amplio en su base unido armónicamente al cuerpo y la cabeza, sin depresiones. Más largo y fino en las hembras.	

3.2 - Papada	Comienza bifida bajo el maxilar inferior, Baja hasta el pecho y se prolonga hasta el ombligo. Tamaño medio, fina y flexible.	Excesiva.
3.3 - Pecho	Amplio y bien cubierto de músculos.	
3.4 - Giba	Bien implantada sobre la cruz, bien desarrollada. En forma de riñón apoyándose sobre el dorso en los machos.	Tamaño medio, ligeramente inclinada. Pequeñas depresiones laterales. Ligeramente adelantada en las hembras.
3.5 - Dorso e lomo	Largo, ancho, recto y profundo. Ligeramente inclinado tendencia horizontal, armoniosamente ligado a la grupa. Buena cobertura muscular.	
3.6 - Ancas y Grupa	Ancas en el mismo nivel, separadas y anchas. Grupa larga, ancha, ligeramente inclinada tendiendo a la horizontal en el mismo nivel y unida al lomo sin salientes ni depresiones, con buena cobertura muscular.	
3.7 - Sacro	Largo, no saliente. Al mismo nivel de las ancas.	Ligeramente saliente. Medianamente largo.
3.8 - Cola y Mota (mechón)	Cola con inserción armoniosa. Larga remata en una mota negra.	Media. Mota con algunos pelos blancos mezclados.
3.9 - Tórax, Costillas, Flancos y Vientre	Tórax amplio, largo y profundo. Costillas largas bien arqueadas con espacios intercostales bien revestidos de músculos y sin depresión detrás de las espaldas. Flancos llenos, profundos y armónicos. Vientre en una misma línea paralela al dorso y al lomo.	Ligera depresión detrás de la espalda.
3.10 - Ombligo	Reducido.	Medio.
4 - MIEMBROS		
4.1 - Miembros anteriores	De longitud media, muslos, colocados en rectángulo, separados y bien aplomados, con hueso fuerte. Espalda larga y oblicua insertándose armoniosamente al tórax.	
4.2 - Miembros posteriores	De longitud media, pierna con muslos anchos con buena cobertura muscular bajando hasta el corvejón (ó garrón) con nalgas bien pronunciadas. Piernas bien aplomadas y separadas. Corvejones (ó garrones), canillas y demás regiones, fuertes bien definidas con hueso fuerte. En las hembras más livianas, con musculatura menos acentuada.	
4.3 - Pezuñas	Negras, bien conformadas, fuertes y lisas con poca separación	

	interdigital.	
5 - ORGANOS GENITALES		
5.1 - Bolsa Escrotal y Testículos	Bolsa escrotal constituida por piel fina, flexible y bien pigmentada, conteniendo dos testículos simétricos de desarrollo normal.	Pequeñas despigmentadas en el escroto. Escroto bifurcado.
5.2 - Vaina o Prepucio	Reducido y proporcionado al desarrollo del animal.	Mediano. Moderadamente penduloso.
5.3 - Mucosa Prepucial	Recogido con la abertura dirigida hacia adelante.	Moderadamente relajada.
5.4 - Ubre y Pezones	Funcional, bien conformada, cubierta de piel fina y flexible, bien pigmentada, pezones medianos a pequeños y bien distribuidos.	
5.5 - Vulva	De conformación y desarrollo normal.	
6 - PELAJE:		
6.1 - Color	Gris en sus diferentes tonalidades. Rojo uniforme en sus diferentes tonalidades. Tercio anterior y posterior generalmente más oscuro en los machos; en las hembras el pelaje es más claro.	Pequeñas manchas más claras o más oscuras.
6.2 - Pelos	Finos, cortos y brillantes	Largos en climas fríos.
6.3 - Piel	Suelta, fina, suave, flexible y oleosa. Bien pigmentada.	Ligera despigmentación en las partes sombreadas.